



Wellensiek

Dierenartsen

Sterilisatie/castratie poes

Wij zullen een korte uitleg geven wat er tijdens de operatie gebeurt en u informeren over de voor- en nazorg van de operatie van uw poes.

Uw poes wordt binnenkort gebracht voor sterilisatie. In feite is de juiste benaming castratie, want de eierstokken en eventueel de baarmoeder worden verwijderd en niet alleen maar afgebonden. Maar om verdere verwarring te voorkomen zullen we het sterilisatie noemen. Na de operatie is de poes niet meer vruchtbaar en wordt niet meer krols.

Wat kunt u zelf doen voor de operatie?

- Zorg dat de poes zo goed mogelijk in conditie is. Bij een goede conditie zijn de operatie risico's kleiner en is er meestal een betere en snellere genezing. Bij te dikke poezen is er een vergroot risico.
- Zorg dat de poes schoon is (geen modder o.i.d.) en vlo vrij is.
- De poes moet NUCHTER zijn. Dit houdt in dat de poes de avond voor de operatie vanaf 19.00 uur niets meer mag eten. Als de poes niet nuchter is, kan ze gaan braken tijdens de narcose en zich verslikken in het braaksel met alle gevolgen van dien. Ze mag wel drinken.
- Zorg dat de poes de avond voor de operatie binnen blijft. Hiermee voorkomt u dat ze niet thuis is wanneer u haar weg wilt brengen.

Wat gebeurt er tijdens de operatie?

Voor de operatie wordt de poes onderzocht; er wordt gekeken of ze helemaal gezond is. Hierna krijgt ze een injectie met narcosemiddel toegediend. Als de poes goed onder narcose is, wordt ze op de operatietafel gelegd. Allereerst worden de ogen gezalfd om uitdroging van de oogbol te voorkomen. Het operatiegebied wordt geschoren, gewassen en gedesinfecteerd. De poes krijgt een injectie pijnstilling. Nadat de dierenarts de steriele handschoenen heeft aangetrokken en de operatie instrumenten zijn klaargelegd, gaat de operatie beginnen.

Normaal gesproken worden alleen de eierstokken verwijderd. Indien de baarmoeder afwijkingen vertoont, wordt ook deze verwijderd. Door het wegnemen van de eierstokken wordt de hormoonproductie stilgelegd en is er geen risico meer op het krijgen van een baarmoederontsteking.

De operatiesnede wordt in meerdere lagen gehecht. Veelal wordt de huid onderhuids gehecht, waarbij u bijna niets meer ziet van het hechtmateriaal.

De hechtingen zullen vanzelf oplossen, hier hoeft u niet meer voor terug komen. Indien er huidhechtingen zichtbaar zijn, mogen deze na 10 dagen verwijderd worden. Hiervoor kunt u een afspraak maken.

Na de operatie wordt de poes naar de opname gebracht, waar ze rustig bij kan komen. Zodra u haar weer op komt halen, zal ze redelijk wakker zijn.

Wat te doen na de operatie?

- Leg de poes op een warm, rustig plekje neer. Ga niet wild met haar spelen en laat haar niet naar buiten gaan.
- De poes mag **nog niets eten, wel water** drinken. (van de narcose kunnen ze misselijk worden met het risico dat ze moet braken). De dag na de operatie mag de poes kleine beetjes eten. Het kan zijn dat de poes helemaal geen trek heeft en dus niet eet. U hoeft zich dan nog geen zorgen te maken, maar als de poes 2 dagen na de operatie nog steeds niets wil eten, dan moet u contact met ons opnemen.
- Let er op dat de poes niet te veel aan de operatie wond likt of bijt. Mocht het zo zijn dat ze dat wel doet, kom dan bij ons een kraag of Petshirt kopen.
- Mocht het zo zijn dat u het niet vertrouwt, bel dan gerust voor een controle afspraak. Beter een keer teveel komen dan een keer te weinig.
- De poes mag na de operatie 5 dagen NIET naar buiten.
- Indien er geen hechtingen zichtbaar zijn, hoeft u niet meer langs te komen.
- Denk eraan dat de poes na de sterilisatie sneller dik wordt. Wij raden u aan om haar wat minder voer te geven.