



**Wellensiek**  
Dierenartsen

### **Laparoscopische sterilisatie/castratie teef**

Wij zullen een korte uitleg geven wat er tijdens de operatie gebeurt en u informeren over de voor- en nazorg van uw hond.

Uw hond wordt binnenkort gebracht voor sterilisatie. In feite is de juiste benaming castratie, want de eierstokken en eventueel de baarmoeder worden verwijderd en niet alleen maar afgebonden. Na de operatie is de hond niet meer vruchtbaar en wordt niet meer loops. Maar om verdere verwarring te voorkomen zullen we het sterilisatie noemen.

### **Wat kunt u zelf doen voor de operatie?**

- Zorg dat de hond zo goed mogelijk in conditie is. Bij een goede conditie zijn de operatie risico's kleiner en is er meestal een betere en snellere genezing. Ook bij te dikke honden is er een vergroot risico.
- Zorg dat de hond schoon is (geen modder o.i.d.) en vlo vrij is.
- De hond moet NUCHTER zijn. Dit houdt in dat de hond de avond voor de operatie vanaf 19.00 uur niets meer mag eten. Als de hond niet nuchter is, kan ze gaan braken tijdens de narcose en zich verslikken in het braaksel met alle gevolgen van dien. Uw hond mag wel drinken.
- Laat de hond voordat u haar brengt, nog even goed uit. De operatie verloopt voorspoediger als darmen en blaas zo veel mogelijk leeg zijn.

### **Wat gebeurt er tijdens de operatie?**

Voor de operatie wordt de hond gewogen en aan de hand van het gewicht wordt de hoeveelheid narcosevloeistof bepaald. Als uw hond goed onder narcose is, wordt ze op de operatietafel gelegd. Vervolgens wordt er een tube in de luchtpijp aangebracht waardoor de toediening van zuurstof en gas anesthesie geregeld kan worden.

Het operatiegebied wordt geschoren, gewassen en gedesinfecteerd. Nadat de dierenarts de steriele handschoenen heeft aangetrokken en de operatie instrumenten zijn klaargelegd, gaat de operatie beginnen. De buik wordt benaderd door het maken van 3 kleine gaatjes. Hierdoor worden met een camera en instrumenten de eierstokken verwijderd.

In de zeldzame situatie dat de baarmoeder afwijkingen vertoont, moet deze verwijderd worden door een normale operatie. Door het wegnemen van de eierstokken wordt de hormoonproductie stilgelegd en is er geen risico meer op het krijgen van een baarmoederontsteking.

De operatiesneden worden in meerdere lagen gehecht. In de meeste gevallen wordt de huid onderhuids gehecht, dan ziet u bijna niets van het hechtmateriaal. De hechtingen zullen vanzelf oplossen, hier hoeft u niet meer voor terug te komen. Indien er huidhechtingen zichtbaar zijn, dan mogen deze na 10 dagen verwijderd worden. Hiervoor kunt u een afspraak maken. De hond krijgt een injectie pijnstilling. Ook wordt er pijnstilling voor een aantal dagen na de ingreep meegegeven in tabletvorm. De hond wordt na de operatie naar de opname gebracht om daar rustig bij te komen. Zodra u haar weer op komt halen, zal ze al aardig wakker zijn.

### **Wat te doen na de operatie?**

- Leg de hond op een warm, rustig plekje neer. Ga niet wild spelen of flink wandelen met de hond.
- De hond mag **nog niets eten, wel water** drinken. (van de narcose kan ze misselijk worden met het risico dat ze moet braken). De dag na de operatie mag de hond kleine beetjes eten. Het kan zijn dat de hond helemaal geen trek heeft en dus niet eet. U hoeft zich dan nog geen zorgen te maken, maar als de hond 2 dagen na de operatie nog steeds niets wil eten, dan moet u contact met ons opnemen.
- Let er op dat de hond niet te veel aan de operatie wond lijkt of bijt. Mocht het zo zijn dat ze dat wel doet, dan kunt u haar een T-shirt aantrekken of een kap bij ons komen halen.
- Mocht het zo zijn dat u het niet vertrouwt, bel dan gerust op om op controle te komen. Beter een keer teveel komen dan een keer te weinig.
- De eerste week moet de hond rustig aandoen, dus niet rennen, stoeien, springen, enz. omdat de wond nog niet volledig genezen is.
- Uw hond mag de komende twee weken niet in het water, dus niet zwemmen of in het bad.
- Indien er geen hechtingen zichtbaar zijn, hoeft u niet meer langs te komen.
- Denk eraan dat de hond na de sterilisatie sneller dik wordt. Wij raden u aan om haar vanaf nu 70% te geven van haar normale dagelijkse hoeveelheid voer.