



# Wellensiek

Dierenartsen

Standaard vaccinatie		Aan te raden vaccinatie
<b>6 weken</b>	Parvo, Hondenziekte	
<b>9 weken</b>	Parvo, Ziekte van Weil	Kennelhoest
<b>12 weken</b>	Parvo, Hondenziekte, Ziekte van Weil, Leverziekte,	Hondsdolheid
<b>1 jaar leeftijd</b>	Parvo, Hondenziekte, Leverziekte, Ziekte van Weil,	Kennelhoest
<b>2 jaar</b>	Ziekte van Weil	Kennelhoest
<b>3 jaar</b>	Ziekte van Weil	Kennelhoest + Hondsdolheid
<b>4 jaar</b>	Parvo, Hondenziekte, Leverziekte, Ziekte van Weil	Kennelhoest
<b>5 jaar en verder</b>	Elke 3 jaar: Parvo, Hondenziekte, Leverziekte, Ziekte van Weil, Tussenliggende jaren: Ziekte van Weil	Kennelhoest jaarlijks Hondsdolheid om de 3 jaar

## Parvo

Parvo is een virus met vaak een dodelijke afloop. Het virus zorgt ervoor dat de darmvlokken in de darm vrijwel volledig vernietigd worden, met als gevolg bloederige diarree, vaak in combinatie met braken en hoge koorts. Honden met een parvo-infectie drogen snel uit en overlijden vaak ondanks intensieve therapie.

## Hondenziekte

Hondenziekte is een paramyxovirus die vele symptomen kan geven. Symptomen die gezien worden zijn neurologische verschijnselen, braken, diarree, oog- en neusuitvloeiing, verdikking van de voetzooltjes en hoesten. Gelukkig komt deze ziekte niet erg veel meer voor in Nederland door het vaccineren van honden. Deze ziekte wordt ook wel "distemper" of "ziekte van carré" genoemd.

## Besmettelijke Leverziekte

Besmettelijke leverziekte is een adenovirus, wat de lever aantast. Als gevolg hiervan zal de lever vaak vergroot zijn en kan de hond gele slijmvliezen krijgen. Andere symptomen, die bij dit virus gezien worden zijn koorts, sloomheid, braken en vergrote lymfeknopen. Deze ziekte kan dodelijk verlopen, maar wordt in Nederland door het vaccinatieprogramma nauwelijks meer gezien. De Latijnse naam voor deze ziekte is Hepatitis Contagiosa Canis.

### **Ziekte van Weil (Leptospirose)**

Deze ziekte (Leptospirose) wordt nog regelmatig gezien in Nederland. Het wordt veroorzaakt door een bacterie die zich in besmet (sloot)water kan bevinden. De bacterie nestelt zich met name in de nieren en lever, waardoor er koorts ontstaat en uiteindelijk deze organen niet meer hun normale functie kunnen vervullen. Symptomen die gezien kunnen worden zijn veel drinken en veel plassen, braken, geelzucht, sloomheid en koorts. Bij tijdige diagnose kan de ziekte na intensieve therapie verdwijnen. Deze ziekte kan ook besmettelijk zijn voor mensen!

### **Kennelhoest**

Kennelhoest is een veel voorkomende ziekte die (meestal) niet dodelijk is voor uw hond. Het wordt veroorzaakt door een combinatie van virussen (waaronder Para-Influenza) en de bacterie Bordetella Bronchiseptica. Deze tasten de voorste luchtwegen aan, waarna de hond erg zal gaan hoesten met soms bloed en slijm. Vaak zal de hond door koorts ook sloom zijn. Omdat er meerdere factoren meespelen bij deze ziekte, is de enting geen garantie dat een hond geen kennelhoest krijgt. Vaak zijn de symptomen wel veel minder dan bij een hond die niet is ingeënt. De meeste pensions stellen de kennelhoestenting verplicht.

### **Hondsdolheid (Rabiës)**

Hondsdolheid is een virusziekte die in Nederland niet meer voorkomt. In het buitenland worden echter wel gevallen gezien en het is dus ook verplicht uw hond in te enten tegen hondsdolheid als hij over de grens gaat (de enting is overigens 3 jaar geldig). Het virus is dodelijk en een dier dat besmet is kan middels bijvoorbeeld een bijtwond ook mensen besmetten, waarbij de infectie (zonder behandeling) ook een dodelijke afloop kan hebben. Honden en katten zullen met name in gedrag veranderen en agressief worden, soms is overmatig kwijlen te zien.